

58-A

Proteína C Funcional- Cromogénico

Deberá concurrir con un ayuno total de 8hs al Laboratorio de la institución que es paciente para la realización del examen.

IMPORTANTE: Previo a concurrir a realizar el examen, deberá tener en cuenta:

- * Si usted ha tenido un episodio de trombosis, deberá esperar o sugerirle a su médico que espere entre tres y seis meses para realizar la prueba.
- * Si usted está recibiendo un tratamiento anticoagulante no es conveniente realizar el estudio (consulte a su médico).
- * En el caso que usted reciba anticoagulantes orales, se recomienda pasar a heparina subcutánea por lo menos diez días antes de la extracción de sangre, y luego suspender la última dosis de ésta para realizar el análisis.
- * Si usted recibe heparina como tratamiento cada 12 horas, deberá suspender la dosis de la noche anterior a sacarse sangre. Si tiene un goteo de heparina, el médico deberá suspenderlo por 4 horas previas a la extracción.



Nuestra sedes

DE LA CAÑADA - Sanatorio Privado Córdoba | Av. Pueyrredón 650.

DE LA CAÑADA - Sanatorio Regional Villa María | Av. Cnel Larrabure 1466.

CASA MEDICA DE LA CAÑADA - Medicina para adultos | Av, Bajada Pucará 1749 (Córdoba).