

660053

Micología, Prueba de Sensibilidad a Antifúngicos

MUJERES

- No deberá mantener relaciones sexuales durante 48 horas (dos días) antes del estudio.
- El día de la toma de la muestra deberá higienizarse con agua los genitales externos y No colocarse cremas, óvulos ni jabón.
- No estar con el Periodo al momento del estudio.

Deberá concurrir **CON TURNO** al Laboratorio en horario vespertino de 15:30 a 17:30 hs.

En caso de solicitud de este estudio por embarazo: deberá realizarlo entre las semanas 35 y 37 de gestación, salvo otra indicación médica

HOMBRES

Previo a realizar estudio:

- No deberá tener relaciones sexuales en los dos días previos al estudio 48 horas antes.
- No colocarse cremas en la zona afectada. Los detergentes, antisépticos y desodorantes íntimos están contraindicados.

Toma de Muestra:

- El día de la toma de la muestra No higienizar los genitales externos y No orinar por lo menos tres horas antes de la recolección de la muestra.
- Deberá concurrir **CON TURNO** a Laboratorio en horario vespertino de 15:30 a 17:30 hs.

Personal de Laboratorio (Bioq.) le realizará la revisión, y en caso de no presentar secreción uretral, le podrá solicitar que orine en un frasco.